

15g, 葫芦茶 9g。水煎 2 次分服, 每日 1 剂。

6. 治胃、十二指肠溃疡疼痛 鲜穿破石 60g。水煎, 3 次分服。(4~6 方出自《全国中草药汇编》)

7. 治胆道蛔虫 篦子根、两面针根、阔叶十大功劳根各 15g。水煎服。(《福建药物志》)

8. 治下肢流火(急性淋巴管炎) 穿破石根皮 90g, 威灵仙 15g, 猪瘦肉 120g。水炖, 服汤食肉。(《江西草药》)

9. 治尿路结石 柘藤根 15g, 野花椒 15g, 千斤拔 30g, 车前草 30g。每日 1 剂, 水煎分 2 次服。(江西《草药手册》)

10. 治闭经 穿破石根 15~30g。水煎服。(《广西本草选编》)

11. 治肺结核 柘藤根 30g, 铁包金(细纹勾儿茶) 60g, 白部 9g。每日 1 剂, 水煎, 分 2 次服。(江西《草药手册》)

12. 治肺热咳血 穿破石 30g。去粗皮, 炒焦, 水煎, 冲糖服, 每日 3 次。(《浙江药用植物志》)

13. 治疗疮痈肿 穿破石鲜根皮或鲜叶, 捣烂外敷。(《广西本草选编》)

14. 治外痔出血 鲜穿破石 120g, 水煎服。另用红马蹄草捣烂外敷患处, 连续 3 次。(《浙江民间常用草药》)

15. 治耳聋、鸣、汗出, 一、二十年不差 故铁二十斤(烧赤, 水五斗浸三宿, 去铁澄清), 柘根三十斤(水一石, 煮取五斗, 去滓澄清), 菖蒲(切)五斗(水一石, 煮取五斗, 去滓澄清)。上三味合一石五斗, 用米二石, 并曲二斗, 酿如常法酒。用一月封头开清, 用磁石吸铁者三斤, 捣为末, 纳酒中, 浸三宿。饮之, 日夜饮, 常取小小醉而眠, 取闻人语乃止药。

16. 治小儿心热, 重舌, 鹅口 柘根(锉)五升。以水五升, 煮取二升, 去滓更煎, 取五合, 细细敷之, 数数为之。(15~16 方出自《千金要方》)

【现代临床研究】治疗急、慢性肝炎 取穿破石 1kg, 五指毛桃(*Ficus simplicissima*) 250g, 葫芦茶 150g。加水浸过药面煮 2 次, 药液合并浓缩至 1500ml, 加白糖 300g 及防腐剂, 静置过滤, 制成“驱黄灵糖浆”。每次服 45ml, 急性黄疸型肝炎及较重的慢性肝炎日服 2 次, 轻症慢性肝炎日服 1 次, 均以 30d 为 1 疗程。经治 72 例, 临床治愈 35 例(其中急性黄疸型肝炎 17 例, 慢性肝炎 18 例), 好转 25 例(急性黄疸型肝炎 6 例, 慢性肝炎 19 例), 无效 12 例^[1]。

【集解】《植物名实图考》:“奴柘,《本草拾遗》始著录。似柘有刺, 高数尺, 江西有之。《湘阴志》:灰桑树, 叶大, 有刺三角, 亦桑类, 即此。”

参考文献

化学成分

[1] Sun N J, et al. Phytochemistry, 1988, 27(3):951

药理

[1] 吕强, 等. 药学通报, 1980, 15(12):564

[2] 吕强, 等. 中成药研究, 1981, (12):40

现代临床研究

[1] 广州市第三人民医院内科. 新医药通讯, 1972, (2):18

1089 奴柘刺 Nuzheci (《本草拾遗》)

【异名】 房着刺、勒路子(广西药用植物名录)。

【来源】 为桑科植物构棘 *Maclura cochinchinensis* (Lour.) Corner 的棘刺。

【原植物】 参见“穿破石”条。

【采收加工】 全年均可采收, 鲜用或晒干。

【药材及产销】 奴柘刺 *Spina Maclurae Cochinchinensis* 产

于长江中下游以南各地及西南等地。自产自销。

【药材鉴别】 性状鉴别 棘刺粗针状, 长 5~10(~20)mm, 直立或略弯。表面灰褐色, 光滑。体轻质硬, 略带韧性, 不易折断, 断面黄色。气微, 味淡。

【化学成分】 嫩枝和叶含柘树异黄酮(cudraisoiflavone) A, 3'-O-甲基香碗豆甾元(3'-O-methylorobol), 去氢木香内酯(dehydrocostus lactone), 亚油酸甲酯(methyl linoleate), β -谷甾醇(β -sitosterol)^[1]。

【药性】 味苦, 性微温。

《本草拾遗》:“味苦, 小温, 无毒。”

【功能与主治】 化痰消积。主治腹中积聚, 痞块。

《本草拾遗》:“主老(妇)血瘕, 男子痿痹、闪痞。”

【用法用量】 内服:煎汤, 6~12g。

【附方】 治老妇血瘕, 男子痿痹、闪痞 取(奴柘)刺和三棱草、马鞭草作煎如稠糖。病在心, 食后;在脐, 空心服。当下恶物。(《本草拾遗》)

参考文献

化学成分

[1] Suc. N J, et al. Phytochemistry, 1988, 27(3):951

1090 山荔枝果 Shanlizhiguo (《贵州草药》)

【异名】 山荔枝(《闽东本草》), 野梅子(湖南、广东)。

【来源】 为桑科植物构棘 *Maclura cochinchinensis* (Lour.) Corner 的果实。

【原植物】 参见“穿破石”条。

【采收加工】 夏、秋季果实近成熟时采收, 鲜用或晒干。

【药材及产销】 山荔枝果 *Fructus Maclurae Cochinchinensis* 产于长江中下游以南各地及西南等地。自产自销。

【药材鉴别】 性状鉴别 果实球形, 直径 3~5cm。鲜品橙红色, 具毛茸, 有乳黄色浆汁, 干品棕红色, 皱缩。剖开后, 果皮内层着生有多数瘦果, 每一瘦果包裹在肉质的花被和苞片中。基部有极短的果柄。气微, 味微甜。

【药性】 味微甘, 性温。

1. 姚可成《食物本草》:“味甘, 无毒。”

2. 《贵州草药》:“性温, 味微甘。”

【功能与主治】 理气, 消食, 利尿。主治疝气, 食积, 小便不利。

1. 姚可成《食物本草》:“治七种疝气及一切疮疡疥癣。”

2. 《贵州草药》:“调气, 利水, 消食。”

【用法用量】 内服:嚼食或煎汤, 15~30g。

【附方】 1. 治膀胱疝气 山荔枝果 30g。水煎服。

2. 治食积腹胀 山荔枝果和根各 30g。水煎服。

3. 治小便不利 山荔枝果和根各 15g。水煎服。(1~3 方出自《贵州草药》)

1091 柘木 Zhemu (《本草拾遗》)

【品种考证】 柘木入药始载于《本草拾遗》。《纲目》收载于木部, 云:“处处山中有之, 喜丛生。干疏而直, 叶丰而厚, 团而有尖。其叶伺蚕……”以上所述及《植物名实图考》的附图与今桑科植物柘树均相符。

【来源】 为桑科植物柘树的木材。

【原植物】 柘树 *Maclura tricuspidata* Carr. [*Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur.] 又名:柘(《诗经》), 柘桑(《淮南子》高诱注), 文章树(《清异录》), 灰桑树(《淮阴县志》), 黄疽树、刺钉(《浙江民