

【集解】《新修本草》：“桑、槐、楮、榆、柳此为五木耳。软者并堪啖。煮浆粥安诸木上，以草覆之，即生蕈尔。”

附注 《证类本草》、《纲目》等文献中的木耳，包括了桑耳、槐耳、榆耳、柳耳、楮耳，《纲目》除木耳独条外，又将桑耳、槐耳、榆耳、柳耳各列专条，另外还有杨栌耳、柘耳等。实际上包括了木耳科木耳属和银耳科的一些可食、常食的种类。最近考证认为槐耳系多孔菌科植物槐栓菌 *Trametes robinophila* Murr.，榆耳系革菌科植物榆耳 *Gloeostereum incarnatum* S. Ito. et Imai，本条所述三个品种皆指黑木耳，而上述诸品种仍各列专条。由于古今分类方法不同，造成品种和临床资料的交叉现象，应互参。

参考文献

化学成分

- [1] 周慧萍,等.中国药科大学学报,1989,20(5):303
- [2] 夏尔宁,等.生物化学与生物物理学报,1988,20(6):614
- [3] Cavazzoni V, et al. Ital J Food Sci, 1992,4(1):9(C A, 1993,118:18929z)
- [4] Huang Buban, et al. Mycologia, 1985,77(6):959(C A, 1986,104:106239r)
- [5] 丁恒山.中国药用孢子植物.第1版.上海科学技术出版社,1982:41
- [6] Yin Guiling, et al. Shipin Kexue, 1985,72:54(C A, 1986,105:59660e)
- [7] Yagi Fumia, et al. Agric Biol Chem, 1988,52(8):2077
- [8] Kim Ha Won. Arch Pharmacol Res, 1993,16(1):36(C A, 1993,119:175620e)
- [9] 吴春敏,等.中国药科大学学报,1991,22(2):97
- [10] Xavier Filho L, et al. Phytton (Buenos Aires), 1985,45(2):187(C A, 1985,103:210556g)

药理

- [1] 汪培清,等.福建中医学院学报,1993,3(4):230
- [2] 申建和,等.中国药科大学学报,1990,21(1):39
- [3] 林志彬.生理科学进展,1983,14(1):18
- [4] 曾雪瑜,等.中国中药杂志,1994,19(7):430
- [5] 张俐娜,等.高等学校化学学报,1994,15(8):1231
- [6] 夏尔宁,等.中国药科大学学报,1989,20(4):227
- [7] 夏尔宁,等.中国药科大学学报,1987,18(2):141
- [8] 夏尔宁,等.南京药学院学报,1985,16(3):49
- [9] 申建和,等.中国药科大学学报,1989,20(6):344
- [10] 肖瑛,等.同济医科大学学报,1990,19(5):328
- [11] 肖瑛,等.同济医科大学学报,1993,22(3):167
- [12] 覃爱娟,等.中国食用菌,1994,13(3):24
- [13] 周慧萍,等.中国药科大学学报,1989,20(5):303
- [14] 陈依军,等.现代应用药学,1989,6(2):9
- [15] 薛惟建,等.中国药科大学学报,1987,18(1):45
- [16] 薛惟建,等.中国药科大学学报,1989,20(3):181
- [17] 何冰芳,等.中国药科大学学报,1991,22(1):48
- [18] 前田幸子,等.蛋白质.核酸.酵素,1976,21(6):430
- [19] 黄年来.中国食用菌百科.第1版.北京:农业出版社,1993:163
- [20] 周慧萍,等.中国药科大学学报,1989,20(1):51
- [21] 丁恒山.中国药用孢子植物.第1版.上海科学技术出版社,1982:41

0190 柘耳 Zheer 《纲目》

【异名】柘黄《纲目》，柘上木耳、柘树耳《药用寄生》。

【来源】为寄生于桑科植物柘树 *Maclura tricuspidata* Carr. 上的木耳 *Auricularia auricula* (L. ex Hook.) Underw.

【原植物】参见“木耳”条。

【采收加工】夏、秋季采，洗净，晒干。

【药性】味甘，性平。归肺、大肠经。

《药用寄生》：“味甘，性平。入肺、大肠经。”

【功能与主治】清肺解毒，化痰止咳。主治肺癰咳吐血，肺燥干咳。

1. 《纲目》：“主治肺癰咳唾脓血腥臭，不问脓成未成。”

2. 《食物考》：“解毒。”

【用法用量】内服：煎汤，9~12g；或入丸、散。

【附方】1. 治肺癰咳唾脓血腥臭 用柘耳一两，研末，同百齿霜二钱，糊丸，梧子大，米饮下三十丸。（《纲目》）

2. 治肺燥热，干咳无痰，舌红少苔 柘耳、白木耳、冰糖各10g，清水炖服，每日1剂。

3. 治肺结核，咳嗽，潮热 柘耳12g，沙田柚寄生15g，鳖甲（炙）10g。加水500ml，煎到250ml，冲蜜糖适量，分3次服，每日1剂。

4. 治大肠燥热，大便秘结 柘耳10~12g，红乌柏树寄生10~12g，阴阳莲12g，水煎代茶频饮。（2~4方出自《药用寄生》）

0191 杨栌耳 Yangluer 《本草拾遗》

【异名】杨栌耳《本草拾遗》。

【来源】为寄生于忍冬科植物半边月杨栌 *Weigela japonica* Thunb. var. *sinica* (Rehd.) Bailey 树上的木耳 *Auricularia auricula* (L. ex Hook.) Underw.

【采收加工】夏、秋季采，洗净，晒干。

【原植物】参见“木耳”条。

【药性】味微甘，性平。归肝、脾、大肠经。

1. 《本草拾遗》：“平，无毒。”

2. 姚可成《食物本草》：“味甘，平。”

【功能与主治】化瘀，止血。主治瘀阻血凝，癰疽结块，痔疮出血。

1. 《本草拾遗》：“主老血结块，破血止血。”

2. 《药用寄生》：“破瘀散结，止血。主治瘀血结块，痔疮出血。”

【用法用量】内服：煎汤，10~12g；或炖服。

【附方】1. 治肝脾肿块 杨栌耳10g，仙人掌（去刺）12g，猪脾脏1具，炖汤服。

2. 治子宫肌瘤 杨栌耳10~12g，核桃树寄生15~30g，蕁头回30g。水煎，分3次服。每日1剂，连服10~15d，停药1星期，再继续服。

3. 治痔疮出血 杨栌耳10~12g，杉木根30g。水煎代茶饮。（1~3方出自《药用寄生》）

0192 毡盖木耳 Zhangaimuer 《中国药用真菌图鉴》

【来源】为木耳科真菌植物毡盖木耳的子实体。

【原植物】毡盖木耳 *Auricularia mesenterica* (Dicks.) Pers. 又名：肠膜状木耳《真菌名词及名称》，肠状木耳《吉林省真菌志》。

子实体平伏或半平伏，常覆瓦状叠生，半圆形、贝壳形至不规则形，直径5~15cm，厚1.5~4mm，半胶质，坚硬；边缘波状，稍有浅裂。表面松软，粘，有蛋壳色、灰白色、深褐色相间的同心环纹，有厚约1mm的绒毛层；绒毛无隔，无色，基部淡黄色，相互交织成非胶质层。子实层面胶质，暗褐色至紫褐色，平滑，有脉纹或网状皱纹。孢子卵形，基部尖，无色，(14~15)μm×(6~7)μm。

生于栎、杨、榆等阔叶树的腐木上。分布于黑龙江、吉林、河北、山西、宁夏、河南、广东、广西、云南、西藏等地。

【药理】抗癌作用 毡盖木耳子实体的热水提取物为多